

PRIJAVA PLANA TRAJNOG USAVRŠAVANJA ZA MEDICINSKE SESTRE

NAZIV USTANOVE:		Dom zdravlja Đakovo			
ADRESA:		P.Preradovića 2			
TELEFON:	031/813-474	FAX:	031/813-474	E-MAIL:	dom-zdravlja-djakovo@os.t-com.hr

DATUM	NAZIV TEME	OPIS	PREDAVAČ (VODITELJ)	MJESTO ODRŽAVANJA
23.01.2017. (ponedjeljak)	Palijativna skrb u primarnoj zdravstvenoj zaštiti	Palijativna skrb ne odnosi samo na skrb u ustanovi. To je čitava filozofija skrbi koja se može primjenjivati u svim oblicima i na svim razinama zdravstvene djelatnosti. Najčešće se susrećemo s organiziranim mobilnim timovima u zajednici, gdje se skrb unosi u bolesnikovu kuću ili, primjerice, u dom za starije osobe, ili u dom za njegu. Jednako tako nailazimo na različite modele palijativne skrbi unutar zdravstvenih ustanova, primjerice, općih bolnica. Službe i organizacijska politika sustava palijativne skrbi moraju pružati velik raspon opcija, kao što su kućna skrb, stacionarna skrb za bolesnike u specifičnim ili konvencionalnim jedinicama, dnevnoj bolnici ili ambulantama, hitnim službama i jedinicama za	Dr.sc. Štefica Mikšić, Marina Jagodić, prvostupnica sestrinstva	DZ ĐAKOVO Čekaonica ATD u 20,00 sati

		njegu za vrijeme odmora ukućana.		
20.02.2017. (ponedjeljak)	BLS + AVD	Kardiopulmonalna reanimacija (skraćeno: KPR) kombinacija je mjera oživljavanja koje se poduzimaju da bi se bolesniku, koji je doživio zastoj disanja i/ili rada srca, tj. kardiorespiratorni arest, ponovno uspostavila funkcija srca i disanja. Glavni cilj izvođenja mjera reanimacije je osigurati dostatnu količinu kisika mozgu, srcu i drugim vitalnim organima, sve dok se složenijim postupcima KPR-a ne uspostavi adekvatna srčana akcija i spontano disanje. Prilikom pristupanja osobi za koju sumnjamo da je doživjela zastoj disanja i/ili rad srca kao prvo moramo provjeriti stanje svijesti i dali bolesnik diše te dali ima pulsa. Po utvrđivanju kardiorespiratornog zastoja treba što brže započeti s mjerama BLS-a, tj. osnovnog održavanja života, pozvati stručnu pomoć čiji će tim nastaviti s mjerama naprednog održavanja života i zbrinuti bolesnika. BLS obuhvaća osiguravanje prohodnog dišnog puta, umjetno disanje i masažu srca.	Tomica Jakobović, mag. med. techn., Dr.sc. Štefica Mikšić	DZ ĐAKOVO Čekaonica ATD u 20,00 sati

27.03.2017. (ponedjeljak)	Ispravno postupanje s djetetom – Baby handling	Stručnjaci smatraju da velik broj novorođenčadi ima moždana krvarenja kao odgovor na traumu rođenja. U 10% djece ta su krvarenja jače izražena, a kod 2-3 % stanje će biti veoma teško. Vrlo je važno da svi roditelji novorođene djece budu obaviješteni o ispravnim postupcima njege svojeg djeteta. Naime, ispravnim dizanjem, spuštanjem, presvlačenjem, hranjenjem i igranjem, odnosno ispravnim postupcima u svakodnevnom životu obitelji roditelji mogu onemogućiti razvijanje takozvanih loših obrazaca pokreta: izvijanje unazad u luku, spastičnost, nemogućnost kontrole glavice i trupa, križanje nožica, zabacivanje glavice unazad itd. Ti loši obrasci pokreta proizilaze (zbog oštećenja mozga) iz djetetove nemogućnosti da pravilno napravi neke pokrete (podizanje glavice, prevrtanje s leđa na trbuh i obratno, odizanje o laktove i šakice itd) pomoću kojih se dijete izvlači iz njemu neugodnih situacija i uz koje se može samostalno gibati (npr. puzati).	Danijela Šadl Jurković, prvostupnica fizioterapije, Nataša Vinković, prvostupnica sestrinstva	DZ ĐAKOVO Čekaonica ATD u 20,00 sati

24.04.2017. (ponedjeljak)	Čimbenici koji utječu na cijeljenje rane	Cijeljenje rane je kompleksan proces koji obuhvaća cijeli niz kemijskih i fizioloških događaja na staničnoj i molekularnoj razini i prolazi kroz četiri faze koje su neoštro međusobno odijeljene. Postoji mnogo čimbenika koji mogu utjecati na cijeljenje rane i svojim djelovanjem usporiti ili u cijelosti prekinuti proces cijeljenja. Ishemija tkiva u okolini rane, koja je posljedica spazma arterija ili aterosklerotičnih promjena u njima, lako može dovesti do usporenja ili čak prekida procesa cijeljenja rane. Infekcija rane i upotreba kortikosteroida su značajne smetnje cijeljenja. ostali čimbenici koji mogu utjecati na tijek cijeljenja rane su neodgovarajuća prehrana s posljedičnim pomanjkanjem energije ili bjelančevina te nekih vitamina, duljina trajanja rane, stanje dna rane, lokalizacija rane. Samo poznavanjem patofiziologije cijeljenja rane, te razumijevanjem svih čimbenika koji mogu utjecati na odgođeno cijeljenje rane možemo adekvatno prevenirati i liječiti kronične rane.	Marina Jagodić, prvostupnica sestrinstva	DZ ĐAKOVO Čekaonica ATD u 20,00 sati
--------------------------------------	---	---	---	---

GLAVNA SESTRA ZDRAVSTVENE USTANOVE

Ime i prezime i potpis

Dr. sc. Štefica Mikšić

RAVNATELJ ZDRAVSTVENE USTANOVE

Ime i prezime i potpis

Boro Knezović, dipl.ing.

M. P.