

PRIJAVA PLANA TRAJNOG USAVRŠAVANJA ZA MEDICINSKE SESTRE

NAZIV USTANOVE:	DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ISPOSTAVA CRIKVENICA			
ADRESA:	RIJEKA,KREŠIMIROVA 52A			
TELEFON:	051/666-022	FAX:	051/337-405	E-MAIL: glavnasestra@domzdravlja-pgz.hr

DATUM	NAZIV TEME	OPIS	PREDAVAČ (VODITELJ)	MJESTO ODRŽAVANJA
04.19. 19,30	Palijativna skrb kroz mobilni palijativni tim	<p>Palijativna skrb je briga za teško i neizlječivo bolesne te umiruće osobe i njihove obitelji.</p> <p>Palijativni pacijent je onaj kojem bolest progredira prema terminalnoj fazi, a očekivani životni vijek je 6-12 mjeseci ili manje. Pacijentu se dodjeljuje šifra Z51.5, time postaje prepoznatljiviji u zdravstvenom sustavu, te mu se na taj način povećava mogućnost dobivanja primjerenije skrbi.</p> <p>U Primorsko-goranskoj županiji djeluje 5 mobilnih palijativnih timova, četiri tima stacionirana su u Rijeci, a jedan tim u Delnicama.</p> <p>Tim čine doktor medicine i prvostupnica sestrinstva. Koordinatori palijativne skrbi komuniciraju s ostalim suradnicima u palijativnoj skrbi, te koordiniraju rad timova.</p> <p>Palijativnog pacijenta mobilnim palijativnim timovima prijavljuje liječnik</p>	Danijela Ostojić, bacc.med.techn.	Crikvenica, Kotorska 13a

		<p>obiteljske medicine, međutim radi dostupnosti skrbi pacijentu, timovi primaju prijave od bilo kojeg sudionika u skrbi. Često se obitelj pacijenta javlja sama mobilnim palijativnim timovima, po preporuci bolničkih liječnika, međutim i patronažne sestre, medicinske sestre u zdravstvenoj njezi u kući, prijatelji i susjadi često prijavljaju pacijente koje prepoznaju kao palijativne.</p> <p>Iznimno je važna dobra komunikacija između svih pružatelja zdravstvene skrbi palijativnom pacijentu. Mobilni palijativni timovi u pravilu na intervenciju izlaze po pozivu, a pacijentu se u kućnoj posjeti nastoje ukloniti simptomi koji mu značajno narušavaju kvalitetu života. Najčešći razlozi pozivanja mobilnih palijativnih timova su bol, tegobe s disanjem, mučnina, povraćanje, dehidracija, odnosno potreba za parenteralnom hidracijom.</p> <p>Cilj: upoznati medicinske sestre s radom mobilnih palijativnih timova Doma zdravlja PGŽ</p>		
05.19. 19,30	Zdravstvena njega pacijenta s perkutanom endoskopskom gastrostomom	P.E.G. je kateter na trbušnoj stjenci koji služi za hranjenje. Postavlja se endoskopskim putem kada pacijent zbog medicinske dijagnoze ne može gutati (maligne bolesti, neurološke,...) ili se очekuje da će unutar liječenja doći do nemogućnosti prolaska hrane prirodnim putem do želuca. Sam medicinsko tehnički zahvat traje 15-20 minuta.	Barbara Samaržija Ingra, bacc. med. techn.	Crikvenica, Kotorska 13a

		<p>Postavljanje P.E.G.-a spada u visokorizičan zahvat, međutim dugoročno gledano omogućuje pacijentu otvoren put hranjenja za vrijeme trajanja bolesti. Postavljen može biti privremeno ili trajno, ovisno o stanju pacijenta i prognozi bolesti.</p> <p>Zamjenski P.E.G. postavlja se u kućnim uvjetima, dakle nije potreban transport pacijenta do bolnice, niti je potrebna prisvjesna sedacija, stoga je za pacijenta manje rizična i ugodnija.</p> <p>Zdravstvena njega bolesnika sa postavljenim PEG-om uključuje provođenje njege kože na mjestu postavljanja sonde, održavanje sonde za hranjenje i količine obroka te pripremu pacijenta za samostalnu njegu kod kuće.</p> <p>Pravilnim održavanjem, edukacijom osoblja i pacijenata ili njihovih njegovatelja sprječavaju se moguće komplikacije koje nažalost nisu rijetke, a pacijentu dodatno otežavaju ionako narušeno zdravstveno stanje.</p> <p>Komplikacije dijelimo na manje (manje krvarenje, infekcije, rane..) ili veće (nekrotizirajući fascitis-nekroza vezivne opne...). Prema vremenu pojavljivanja dijelimo ih na rane ili kasne.</p> <p>Cilj: Educirati med.sestre o pravilnoj njezi endoskopsko postavljenog P.E.G.a -kao i promjene zamjenskog P.E.G.-a u kućnim uvjetima.</p>		
--	--	--	--	--

10.19. 19,30	Sestrinska dokumentacija-informatizacija i zaštita podataka	<p>Sestrinska dokumentacija se kroz povijest se razvijala usporedno sa sestrinstvom te je njen postojanje važno za napredak sestrinske skrbi. Obrasci sestrinske dokumentacije služe praćenju pacijentovog zdravstvenog funkcioniranja, a popunjavaju se prema određenim pravilima koja su zakonski regulirana. Sestrinska dokumentacija je dokument koji se koristi u medicinsko sudskim procesima, edukaciji medicinskih sestara i analizama kvalitete.</p> <p>U suvremeno vrijeme sestrinska dokumentacija je digitalizirana, tj. bilježi se i elektronski kako bi se podaci prikupljali i čuvali sustavno. U Republici Hrvatskoj informatizacija zdravstva traje od devedesetih godina, te se i dalje nastavlja razvijati. CEZIH (centralni informacijski sustav Republike Hrvatske) predstavlja temelj informatizacije kojim se služi cijelo zdravstvo, ovisno o potrebama pojedine zdravstvene ustanove, pa su tako opisane funkcionalnosti CEZIH-a kao što je elektronski zdravstveni karton, e-recepti i uputnice. Pri svim ovim informatiziranim sadržajima nastaje prostor za krađu i zloupotrebu podataka koje je potrebno dobro zaštititi. Razmotreni su sigurnosni rizici i slabosti koje utječu na sigurnost podataka. Kako bi se štitila sigurnost povjerljivih podataka primjenjuje se kriptografija te razne vrste enkripcije te</p>	Ivana Kočić, bacc.med.techn.	Crikvenica, Kotorska 13a
-----------------	---	---	---------------------------------	-----------------------------

		<p>su navedene njihove prednosti i mane. S enkripcijom se koriste i razne metode sigurnog povezivanja kao što su pametne kartice, VPN i lozinke. Uz kriptografiju dan je i primjer drugačije vrste zaštite podataka koje se vrši sakrivanjem u sliku, a zove se steganografija te u kombinaciji sa enkripcijom obećava mnogo na temu zaštite povjerljivih podataka.</p> <p>Cilj: Upoznati med.sestre s važnošću zaštite sestrinske dokumentacije</p>		
11.19. 19,30	Zdravstvena njega pacijenta s autonomnom disrefleksijom	<p>Autonomna disrefleksija (AD) je klinički sindrom koji se javlja u osoba s oštećenjem kralježnične moždine (OKM). AD se najčešće pojavljuje u osoba s OKM u visini Th6 ili više ali isto tako se može pojaviti i u osoba s OKM do Th10. OKM dovodi do nekontroliranog odgovora simpatičkog sustava, dovodeći između ostalog i do arterijske hipertenzije odnosno do hipertenzivne krize koja može biti i životno ugrožavajuća. Radi se o medicinskoj hitnoći koja zahtijeva brzo prepoznavanje i promptno liječenje. Neliječena, AD može dovesti do cerebrovaskularnih i kardiovaskularnih komplikacija i smrti, a sve kao posljedica nekontrolirane hipertenzije. Distanzija mokraćnoga mjehura ili njegova iritacija je odgovorna za 75-85% slučajeva. Iritacija mokraćnoga mjehura je najčešće uzrokovana blokiranim ili začepljenim kateterom zbog njegova presavijanja ili</p>	Nada Strčić, mag.med.techn.	Crikvenica, Kotorska 13a

		<p>neadekvatnom samokateterizacijom. Slijedeći uzrok po učestalosti je distenzija crijeva koja je pak najčešće posljedica impakcije fecesa. Ona je odgovorna za 13-19% slučajeva. Posebno značenje ovog sindroma je u tome što može dovesti do stanja koje može akutno ugroziti život osobe s OKM. Iz toga razloga osobe s OKM, njihova pratička odnosno osobe koje se skrbe o njima kao i zdravstveni djelatnici trebali bi biti upoznati s ovim sindromom.</p> <p>Cilj: upoznati med.sestre s sindromom autonomne disrefleksija</p>		
--	--	--	--	--

GLAVNA SESTRA ZDRAVSTVENE USTANOVE

Ime i prezime i potpis
Rozmari Tusić,mag.med.techn.

M. P.

RAVNATELJ ZDRAVSTVENE USTANOVE

Ime i prezime i potpis
Doc.dr.sc.Vladimir Mozetič,dr.med.MHA