# PRIJAVA PLANA TRAJNOG STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZA MEDICINSKE SESTRE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NAZIV USTANOVE:** | **KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA** | | | | |
| ADRESA: | KREŠIMIROVA 42, 51000 RIJEKA | | | | |
| TELEFON: | 051 658 111 | | | FAX: 051 658 833 | E-MAIL:glavna-sestra@kbc-rijeka.hr |

| DATUM | NAZIV TEME | SAŽETAK (250 do 300 znakova) | PREDAVAČ | MJESTO ODRŽAVANJA |
|---|---|---|---|---|
| 2021. | Praćenje i zbrinjavanje nuspojava hematoonkoloških bolesnika | Kemoterapija sprečava rast malignih stanica i njihovu diobu. Kemoterapija osim što uništava maligne stanice, uništava i zdrave stanice jer nema selektivno djelovanje pa su nuspojave kod hematološko-onkoloških bolesnika neizbježne. Nuspojave se javljaju u različitim fazama liječenja, kao blage, akutne i kronične nuspojave. U nadzoru i tretiranju nuspojava bolesnika sudjeluju medicinske sestre/ tehničari koje kontinuirano provode zdravstvenu njegu pri čemu je važan holistički pristup, psihofizička priprema pacijenta, zbrinjavanje osnovnih ljudskih potreba povezanih sa nuspojavama kemoterapije, a još važnije njihova prevencija, rana detekcija te njihovo ublažavanje. | Antonela Trobentar, mag. med. techn.<br><br>Matilda Rudec, bacc. med. techn. | KBC Rijeka |
| 2021. | Pravilna aplikacija inzulinske terapije i samokontrola glikemije | Dijabetes je kronični poremećaj metabolizma čije osnovno obilježje je povišena koncentracija glukoze u krvi, hiperglikemija. U liječenju šećerne bolesti uz primjenu dijabetične dijete i promjene životnog stila primjenjuje se peroralna antidijabetična terapija i inzulin. Samokontrola također ima značajnu ulogu u liječenju dijabetesa, a rezultati samokontrole daju | Natalija Jurčić, bacc.med.techn. | KBC Rijeka |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | informacije na osnovu kojih će se lakše prilagoditi terapija. Pravilnom primjenom pen-štrcaljki i pen-iglica, osigurava se maksimalna učinkovitost i pouzdanost odabrane vrste inzulina. Dobra i standardizirana edukacija osnova je liječenja šećerne bolesti i početna točka prema kvalitetnom životu osoba sa šećernom bolesti. | | |
| 2021. | Pojavnost hospitalizma kod djece na Klinici za dječju kirurgiju u dobi od 7 do 11 godina | Pacijenti koji borave na Klinici za dječju kirurgiju imaju mogućnost boravka jednog od roditelja 24h uz njih. U ovom predavanju biti će prikazani rezultati ankete provedene na Klinici. Anketa je obuhvatila dva odjela u sklopu Klinike za dječju kirurgiju. Hospitalizam bitno utječe na suradljivost djeteta u tijeku zdravstvene skrbi na sve segmente jer dijete i njegov roditelj smanjuju ili produžuju vrijeme koje je potrebno uložiti na njegu pacijenta, previjanje ili toaletu rane, edukaciju o novim načinima obavljanja svakodnevnih životnih aktivnosti. Bitno je pravovremeno prepoznati znakove pojavnosti hospitalizma te prevenirati dublji utjecaj na svakodnevne životne situacije. | Irena Barbarić, mag.med.techn. | KBC Rijeka |
| 2021. | Ispadi u vidnom polju i progresija glaukomske bolesti | Ispadi u vidnom polju mogu biti važna smjernica u postavljanju konačne dijagnoze ili isključivanju neke bolesti. Vidnim poljem dobivamo podatke o funkcionalnom oštećenju vidnog živca. Poremećaji vidnog polja mogu biti uzrokovani očnim bolestima ali i mnogim bolestima mozga i moždanih putova, tako da pretragu vidnog polja u dijagnostici najviše koriste oftalmolozi i neurolozi. Perimetrija je metoda kojom mjerimo vidno polje, odnosno ispitujemo granice vidnog polja i postojanje ispada u njemu. Rezultati pretrage su važni za analizu perifernog vida, | Ana Ljubobratović, bacc.med.techn. | KBC Rijeka |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | odnosno otkrivanje poremećaja u rubnim dijelovima vidnog polja. U kliničkom radu perimetrija je bitna za rano otkrivanje abnormalnosti, diferencijalnu dijagnozu, praćenje progresije i remisije bolesti te otkrivanje nezapaženih oštećenja vida. | | |
| 2021. | Intervencije medicinske sestre kod elastografije (Fibroscan) jetre | Elastografija je neinvazivna metoda procjene stupnja oštećenja jetrenog tkiva. Mjerenjem niskofrekventnog zvučnog vala koji se pomiče uzduž jetre ovaj test bilježi brzinu kojom se zvučni valovi pomiču što kolerira sa stupnjem jetrene fibroze. Što je gušće (fibroznije tkivo) to se zvučni valovi brže pomiču. Korištenjem ultrazvučne tehnologije test je brz i bezbolan. Vrijeme ispitivanja je u trajanju od 5 – 10 min. Troškovi elastrografije jetre su manji od biopsije jetre. Medicinska sestra je neizostavan dio tima u provedbi dijagnostike. | Blanka Josipović, bacc.med.techn. | KBC Rijeka |

**ODGOVORNA OSOBA ZA IZRADU PLANA TRAJNOG STRUČNOG USAVRŠAVANJA**

Ime i prezime i potpis
Mirjana Lakić, dipl.med.techn.

**RAVNATELJ USTANOVE**

Ime i prezime i potpis
Prof.dr.sc. Alen Ružić, dr.med.

**ODGOVORNA OSOBA ZA SESTRINSTVO U USTANOVI**

Ime i prezime i potpis
Snježana Juričić, dipl.med.techn.