

PRIJAVA PLANA TRAJNOG STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZA MEDICINSKE SESTRE

NAZIV USTANOVE:		SPECIJALNA BOLNICA ARITHERA			
ADRESA:		BUKOVAČKA CESTA 1, ZAGREB			
TELEFON:	01/2304074	FAX:		E-MAIL:	zeljka@arither.hr

DATUM	NAZIV TEME	SAŽETAK (250 do 300 znakova)	PREDAVAČ (VODITELJ)	MJESTO ODRŽAVANJA
21.02.2024.	Intervencije medicinske sestre kod pacijenta nakon transplantacije jetre	Transplantacijom jetre uklanja se jetra koja više nije funkcionalna te se zamjenjuje zdravom jetrom preminulog darivatelja ili dijelom jetre živog darivatelja. Transplantacija uključuje višesatni operativni zahvat te oporavak koji iziskuje daljnju primjenu imunosupresivne terapije i redovne lječničke kontrole. Intervencije medicinske sestre usmjerene su na provođenje zdravstvene njege te edukaciju transplantiranog pacijenta i njegove obitelji.	Ivana Dragičević, bacc.med.techn. Ivana Vrca Kuprešak, bacc.med.techn.	SB ARITHERA
17.04.2024.	Intervencije anesteziološke medicinske sestre kod bolesnika u općoj i regionalnoj anesteziji	Intervencije anesteziološke medicinske sestre u općoj i regionalnoj anesteziji obuhvaćaju širok opseg poslova i veliku odgovornost prema bolesniku. Bez obzira o kojoj vrsti anestezije je riječ, intervencije u anesteziološkoj pripremi su iste za sve vrste anestezija. Cilj predavanja je prikazati intervencije koje počinju pripremom bolesnika, tehnike anestezije, pripreme u operacijskoj sali i sobi za	Barica Karaga, bacc.med.techn. Željka Anić, bacc.med.techn.	SB ARITHERA

		postanestezijski oporavak, te sve protokole vezane za izvođenje anestezija.		
19.06.2024.	Bilateralna artroplastika kuka	Artritis kuka je je uobičajeno stanje koje pogađa značajan dio populacije. Totalna artroplastika kuka (THA) je kirurški zahvat koji se izvodi u svrhu ublažavanja simptoma artritisa. BHA je jednofazna bilateralna artroplastika kuka podrazumjeva zamjenu oba kuka u jednoj operaciji. Cilj predavanja je prikazati rezultate retrospektivne studije u SB Aritheri koja je uključivala 253 pacijenta kojima je učinjena THA, te 24 pacijenta koji su bili podvrgnuti jednofaznoj BHA. Provedena studija sugerira da je jednofazni BHA sigurna i učinkovita alternativa unilateralnom THA.	Ivan Karlak, spec.ortoped, subspec. traumatolog	SB ARITHERA
25.09.2024.	Intravenozna kanila i njezina primjena	Intravenozna kanila je fleksibilna cjevčica koja sadrži iglu kao vodilicu, koja se uvede u krvni optok na periferiji. Indikacija za uvođenje intravenozne kanile uključuje kratkotrajnu terapiju, bolus injekciju, kratke infuzije kod ambulantnih pacijenata i terapiju kroz tri do pet dana. Distalne vene su pogodne za uvođenje intravenske kanile. Postavljanje intravenske kanile nije samo teorijska već i praktična vještina koja se ponavljanjem usavršava.	Barica Karaga, bacc.med.techn. Mirjana Fištrek, med. sestra	SB ARITHERA

**ODGOVORNA OSOBA ZA IZRADU PLANA TRAJNOG
STRUČNOG USAVRŠAVANJA**

Ime i prezime i potpis

Željka Anić, bacc.med.techn.
bacc.physioth.

ODGOVORNA OSOBA ZA SESTRINSTVO U USTANOVI

Ime i prezime i potpis

Željka Anić, bacc.med.techn.

RAVNATELJ USTANOVE

Ime i prezime i potpis

Arijana Hegediš Došen,